



MINISTERO DELLA SALUTE

Istituto Superiore di Sanità

Centro Nazionale Trapianti



WHO Collaborating Centre
On Vigilance and Surveillance for
Human Cells, Tissues and Organs

17 marzo 2021

Roma.

Prot. 437/CNT2021

Assessorati alla Sanità

Centri Regionali di Riferimento per i Trapianti

Centro Regionale Nitp

Dott. Giovanni Rezza
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria
Direttore Generale
Ministero della Salute

Dott.ssa Maria Rita Tamburrini
Direttore Ufficio VII Trapianti, sangue ed emocomponenti
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria
Ministero della Salute

Dott. Francesco Paolo Maraglino
Direttore Ufficio V -Prevenzione delle malattie
trasmissibili e profilassi internazionale
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria
Ministero della Salute

Prof. Giovanni Cammarota
Responsabile Centro FMT
Dirigente Medico Medicina Interna e Gastroenterologia
Fondazione Policlinico Universitario "Agostino Gemelli"
Roma

Prof. Vincenzo Stanghellini
Responsabile Centro FMT
UO Medicina Interna
Azienda Ospedaliero Universitaria
Policlinico Sant'Orsola Malpighi
Bologna

Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma
Tel +39 06/4990.4040 - 4041 - 4045
Fax. +39 06/4990.4101
e-mail: cnt@iss.it - PEC: cnt@pec.iss.it

www.trapianti.salute.gov.it

Prof. Stefano Milani
Responsabile Centro FMT
SOD Gastroenterologia Clinica
AOU Careggi
Firenze

Prof. Santino Marchi
Responsabile Centro FMT
Direttore UO Gastroenterologia
AOU Pisana
Pisa

E, p.c.

Prof. Silvio Brusaferrò
Presidente Istituto Superiore di Sanità

Dott. Patrizio Pezzotti
Dott.ssa Flavia Riccardo
Dipartimento Malattie Infettive –DMI
Istituto Superiore di Sanità

Oggetto: indicazioni sullo screening del donatore all'interno del Programma Nazionale FMT in soggetti con anamnesi positiva per somministrazione di vaccino anti-SARS-CoV-2.

Gentilissimi,

in relazione all'avvio della campagna vaccinale anti-SARS-CoV-2 secondo quanto riportato nel "Piano strategico dell'Italia per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19" e in riferimento alle indicazioni riportate dal panel di esperti internazionali sul FMT¹, si raccomanda di procedere allo screening del donatore come segue:

- 1) aspettare almeno 7-10 giorni dopo ciascun episodio vaccinale in caso sia stato somministrato al potenziale donatore un vaccino a base di mRNA o con vettore virale non replicante;
- 2) aspettare almeno due mesi dopo la vaccinazione in caso sia stato somministrato al potenziale donatore un vaccino vivo attenuato.

¹ SARS-CoV-2 vaccines and donor recruitment for FMT. Ianiro G, Mullish BH, Hvas CL, Segal JP, Kuijper EJ, Costello SP, Kelly CR, Allegretti JR, Fischer M, Iqbal TH, Satokari R, Kao D, van Prehn J, Ng SC, Bibbò S, Baunwall SMD, Quraishi MN, Sokol H, Zhang F, Keller J, Masucci L, Quaranta G, Kassam Z, Sanguinetti M, Tilg H, Gasbarrini A, Cammarota G. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2021 Feb 8: S2468-1253(21)00032-7. doi: 10.1016/S2468-1253(21)00032-7

Per tutti i donatori, anche per quelli vaccinati, continuano comunque ad essere applicabili le disposizioni fino ad oggi adottate per la prevenzione della trasmissione di SARS-CoV-2 attraverso il trapianto di microbiota fecale effettuato all'interno del Programma Nazionale FMT.

Le indicazioni formulate sono suscettibili di aggiornamento in relazione all'acquisizione di ulteriori evidenze scientifiche e la loro applicazione sarà strettamente correlata al piano vaccinale nazionale e alla disponibilità del vaccino stesso.

Cordialmente,

Il Direttore del Centro Nazionale Trapianti
Dr. Massimo Cardillo

